

Total number of pages -16

CODE : 35T CHEM

(EN/AS/BN)

2025

**CHEMISTRY  
(Theory)**

**Full Marks : 70**

**Pass Marks : 21**

**Time : Three hours**

*The figures in the margin indicate full marks for the questions.*

**General Instructions :**

- (i) All questions are compulsory.
  - (ii) Marks for each question are indicated against it.
  - (iii) Answers should be specific and to the point.
  - (iv) Question numbers **1** to **8** consist of eight very short answer-type questions and carry **1** mark each.....  $1 \times 8 = 8$
  - (v) Question numbers **9** to **18** are short answer-type questions and carry **2** marks each.....  $2 \times 10 = 20$
  - (vi) Question numbers **19** to **27** are also short answer-type questions and carry **3** marks each.....  $3 \times 9 = 27$
  - (vii) Question numbers **28** to **30** are long answer-type questions and carry **5** marks each.....  $5 \times 3 = 15$
- 
- Total = 70

1. For an ideal solution at constant T and P, the correct options is/  
are —

ধ্রুক T আৰু P ত, এটা আদৰ্শ দ্রব্যৰ বাবে সঠিক বিকল্পটো/বিকল্পসমূহ হ'ল —

ধ্রুক T এবং P তে একটি আদৰ্শ দ্রব্যের জন্য সঠিক বিকল্পটি/বিকল্পসমূহ হ'ল —

- (a)  $\Delta_{mix}G = 0$
- (b)  $\Delta_{mix}S = 0$
- (c)  $\Delta_{mix}V = 0$
- (d)  $\Delta_{mix}H = 0$

2. On electrolysis of dilute sulphuric acid using platinum electrode  
the product obtained at the anode will be —

প্লাটিনাম ইলেক্ট্রোড ব্যবহার কৰি লঘু সালফিউরিক এচিডৰ বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণৰ সময়ত এন্ডত  
উৎপন্ন বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ হ'ব —

প্লাটিনাম ইলেক্ট্রোড ব্যবহার কৰে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের সময়ে অ্যানোডে  
উৎপন্ন বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ —

- (a) O<sub>2</sub> gas
- (b) H<sub>2</sub>S gas
- (c) SO<sub>2</sub> gas
- (d) H<sub>2</sub> gas

3. What is the order of the gas formation reaction at the surface of  
tungsten due to adsorption ?

টাংস্টেনৰ পৃষ্ঠত শোষণৰ ফলত হোৱা গেছ গঠন বিক্রিয়াৰ ক্ৰম কি?



টাংস্টেনেৰ পৃষ্ঠে শোষণেৰ ফলে হওয়া গ্যাস গঠন বিক্রিয়াৰ ক্ৰম কী?

- (a) 1<sup>st</sup> order / প্ৰথম ক্ৰম / প্ৰথম ক্ৰম
- (b) 2<sup>nd</sup> order / দ্বিতীয় ক্ৰম / দ্বিতীয় ক্ৰম
- (c) Pseudo 1<sup>st</sup> order / ছিউড়' প্ৰথম ক্ৰম / প্ৰথম ক্ৰম সিউড়ো
- (d) Zero order / শূন্য ক্ৰম / শূন্য ক্ৰম

4. Which one of the following will show coordination isomerism ? 1

তলৰ কোনটোৱে সময়ী সমযোগীতা দেখুৱায় ?





নীচেৱ কোন্টি সময়ী সমযোগীতা দেখায় ?



5. Identify the gas that readily decolourise acidified  $\text{KMnO}_4$  solution. 1

এচিডিযুক্ত  $\text{KMnO}_4$  দ্রবক সহজে বৰণহীণ কৰিব পৰা গেছটোৱ চিনান্ত কৰা।

অ্যাসিডিযুক্ত  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণকে সহজে বৰণহীন কৰতে পাৰা গ্যাসটি শনান্ত কৰো।



6. Which of the following base is not present in DNA ? 1

নিম্নোক্ত কোনটো ক্ষাৰ DNA ত নাথাকে ?

নিম্নোক্ত কোন্ ক্ষাৱটি ডি.এন.এ-তে থাকে না ?

(a) adenine / এডেনিন / অ্যাডেনিন

(b) guanine / গুৱানিন / গুয়ানিন

(c) thymine / থাইমিন / থাইমিন

(d) uracil / ইউৰাচিল / ইউৱাসিল

7.  $\alpha$ -D (+)-glucose and  $\beta$ -D(+)-glucose are —

1

$\alpha$ -D (+)-গ্লুকোজ আৰু  $\beta$ -D(+)-গ্লুকোজ বিলাক —

$\alpha$ -D (+)-গ্লুকোজ এবং  $\beta$ -D(+)-গ্লুকোজগুলি—

(a) conformers / কনফর্মাৰ / কনফৰ্মাৰ

(b) epimers / এপিমাৰ / এপিমাৰ

(c) anomers / অনমাৰ / অ্যানোমাৰ

(d) enantiomers / ইনান্টিওমাৰ / ইনান্টিওমাৰ

8. From amongst the following alcohols the one that would react fastest with conc. HCl and anhydrous  $ZnCl_2$ , is —

1

নিম্নলিখিত এলকহলসমূহৰ ভিতৰত কোনটো এলকহলে গাঢ় HCl আৰু অনাদ্র  $ZnCl_2$  ৰ সৈতে দ্রুততম বিক্ৰিয়া কৰিব —

নিম্নলিখিত অ্যালকোহলসমূহৰে ভিতৰে কোন্ অ্যালকোহলটি গাঢ় HCl এবং অ্যানহাইড্ৰাইড (অনাদ্র)  $ZnCl_2$  -এর সঙ্গে দ্রুততম বিক্ৰিয়া কৰবে ?

(a) 2-Butanol / 2-বিউটানল / 2-বিউটানল

(b) 2-Methylpropan-2-ol / 2-মিথাইলপ্ৰপেন-2-অল / 2-মিথাইলপ্ৰপান-2-োল

(c) 2-Methylpropanol / 2-মিথাইলপ্ৰপানল / 2-মিথাইলপ্ৰপানল

(d) 1-Butanol / 1-বিউটানল / 1-বিউটানল

9. Which one is more reducing  $Cr^{2+}$  or  $Fe^{2+}$  and why ?

2

$Cr^{2+}$  আৰু  $Fe^{2+}$  ৰ ভিতৰত কোনটো বেছি শক্তিশালী বিজাৰক আৰু কিয় কাৰণ দেখুওৱা ?

$Cr^{2+}$  এবং  $Fe^{2+}$  -এর ভিতৰে কোন্টি বেশি শক্তিশালী বিজাৰক এবং কেন কাৰণ দেখাও ?

10. Give reason why HCl is not used to acidify  $Fe^{2+}$  solution in volumetric determination of  $Fe^{2+}$  with  $KMnO_4$  solution.

2

$KMnO_4$  দ্রবণের দ্বাৰা  $Fe^{2+}$  ৰ আয়তনিক নিৰপণত  $Fe^{2+}$  দ্রবণ আম্লিক কৰিবৰ বাবে HCl কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কাৰণ দেখুওৱা।

$KMnO_4$  দ্রবণের দ্বাৰা  $Fe^{2+}$  -এর আয়তনিক নিৰদপণে  $Fe^{2+}$  দ্রবণ আম্লিক কৰাৰ জন্য HCl কেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় না, কাৰণ দেখাও।

11. Aqueous solution of  $Ti^{4+}$  is colourless, but aqueous solution of  $Ti^{3+}$  is violet in colour. Explain. 2

$Ti^{4+}$  ব জলীয় দ্রবণ বর্ণহীন, কিন্তু  $Ti^{3+}$  ব জলীয় দ্রবণ বেগুনীয়া, ব্যাখ্যা করা।

$Ti^{4+}$ -এর জলীয় দ্রবণ বর্ণহীন, কিন্তু  $Ti^{3+}$ -এর জলীয় দ্রবণ বেগুনী, ব্যাখ্যা করো।

**Or / নাইবা / অথবা**

- Why the enthalpies of atomization of the transition metals are high ? 2

সংক্রমণশীল ধাতুবোর্ব পরমাণুকরণ এন্থ্যালপির মান কিয় অধিক হয় ?

সংক্রমণশীল ধাতুগুলির পরমাণুকরণ এন্থ্যালপির মান কেন বেশি হয় ?

12. The two complexes of nickel,  $[Ni(CN)_4]^{2-}$  and  $[Ni(CO)_4]$ , have different structures but possess same magnetic behavior. Explain. 2

নিকেলের দুটা জটিল যৌগ,  $[Ni(CN)_4]^{2-}$  আৰু  $[Ni(CO)_4]$ , গঠন আকৃতি ভিন্ন কিন্তু চুম্বকীয় আচরণ একে। ব্যাখ্যা করা।

নিকেলের দুটি কমপ্লেক্স (জটিল যৌগ),  $[Ni(CN)_4]^{2-}$  এবং  $[Ni(CO)_4]$ , গঠন আকৃতি ভিন্ন কিন্তু চুম্বকীয় আচরণ এক। ব্যাখ্যা করো।

**Or / নাইবা / অথবা**

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$  is an inner orbital complex ion whereas  $[Ni(NH_3)_6]^{3+}$  is an outer orbital complex ion. Explain. 2

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$  এটা অন্তঃ অবিটেল জটিল আয়ন, আনহাতে  $[Ni(NH_3)_6]^{3+}$  এটা বহিঃ অবিটেল জটিল আয়ন। ব্যাখ্যা করা।

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$  একটি অন্তঃ অবিটেল জটিল আয়ন, অন্যদিকে  $[Ni(NH_3)_6]^{3+}$  একটি বহিঃ অবিটেল জটিল আয়ন। ব্যাখ্যা করো।

13. Write the IUPAC name of the following : (*any two*) 1 + 1 = 2

নিম্নলিখিতবোৰ IUPAC নাম লিখা : (যিকোনো দুটা)

নিম্নলিখিতগুলির IUPAC নাম লেখো : (যে-কোনো দুটি)

(a)  $[Co(en)_2Cl_2]$

(b)  $K_4[Fe(CN)_6]$

(c)  $[Co(NH_3)_6] [Cr(CN)_6]$

14. Draw the facial and meridional isomers of  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$ . 1+1=2

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$  বা ফেচিয়েল আৰু মেরিডিয়নেল সমযোগীসমূহ আঁকা।

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$  এৰ ফেসিয়াল এবং মেরিডিয়ালেল সমযোগীসমূহকে অঙ্কন কৰো।

15. How will you synthesize the following from Phenol ? 1+1=2

ফিনলৰ পৰা নিম্নলিখিতসমূহক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিবা?

ফেনলেৱ থেকে নিম্নোক্তগুলিকে কীভাৱে প্ৰস্তুত কৰবে?

(a) Benzene / বেনজিন / বেনজিন

(b) Salicylic acid / ছেলিচাইলিক এচিড / স্যালিসাইলিক অ্যাসিড

16. Explain why : (*any one*) 2

কিয় ব্যাখ্যা কৰা : (যিকোনো এটা)

কেন ব্যাখ্যা কৰো : (যে-কোনো একটি)

- (a) The basicity of  $3^\circ$  amine is lower than that of  $2^\circ$  amine in aqueous solution.

জলীয় দ্রবত  $3^\circ$  এমিনৰ ক্ষাৰকীয়তা  $2^\circ$  এমিনতকে কম।

জলীয় দ্রবণে  $3^\circ$  অ্যামিনৰ ক্ষাৰকীয়তা  $2^\circ$  অ্যামিনৰ থেকে কম।

- (b) Although amino group is *o*- and *p*- directing in aromatic electrophilic substitution reactions, aniline on nitration with conc.  $\text{HNO}_3$  and  $\text{H}_2\text{SO}_4$  gives a substantial amount of *m*-nitroaniline.

যদিও এমিন' গুপে ইলেক্ট্ৰফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া *o*- আৰু *p*-স্থানত সংঘটিত কৰে, কিন্তু এনিলিনৰ গাঢ়  $\text{HNO}_3$  আৰু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  বা দ্বাৰা নাইট্ৰেশনত যথেষ্ট পৰিমাণে *m*-নাইট্ৰোএনিলিন উৎপন্ন হয়।

যদিও বা অ্যামিনো গুপে ইলেক্ট্ৰফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া *o*- এবং *p*-স্থানে সংঘটিত কৰে, কিন্তু অ্যানিলিনৰ গাঢ়  $\text{HNO}_3$  এবং  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -এৰ দ্বাৰা নাইট্ৰেশনে যথেষ্ট পৰিমাণে *m*-নাইট্ৰোঅ্যানিলিন উৎপন্ন হয়।

17. Write only the chemical reactions of the following :

1+1=2

নিম্নলিখিত বাবে কেবল রাসায়নিক সমীকরণ লিখা :

নিম্নোক্তগুলির জন্য কেবল রাসায়নিক সমীকরণ লেখো :

(a) Hoffmann bromamide reaction

হফমেন ব্রমেইড বিক্রিয়া

হফমেন ব্রোম্যাইড বিক্রিয়া

(b) Carbylamine reaction

কার্বিলেমিন বিক্রিয়া

কার্বিলেমিন বিক্রিয়া

Or / নাইবা / অথবা

How will you distinguish 2° and 3° amine by using same chemical test ?

2

একেটা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যবহার করি 2° আৰু 3° এমাইনৰ পার্থক্য দেখুওৱা।

একই রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যবহার কৰে 2° এবং 3° অ্যামাইনৰ পার্থক্য দেখাও।

18. What is the significance of Gabriel phthalimide synthesis ? Why this method is not useful to synthesis aniline ?

1+1=2

গেব্ৰিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰ বৈশিষ্ট্য কি ? এই পদ্ধতিটো এনিলিন প্রস্তুতকৰণৰ বাবে উপযুক্ত নহয় কিয় ?

গ্যাব্ৰিয়েল থ্যালামাইড সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰ বৈশিষ্ট্য কী ? এই পদ্ধতিটি অ্যানিলিন প্রস্তুতকৰণেৰ জন্য উপযুক্ত নয় কেন ?

19. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

নীচেৰ প্ৰশ্নগুলিৰ উত্তৰ দাও :

(a) Give an example of maximum boiling azeotrope mixture.

1

উচ্চতম উত্তলাংক বিশিষ্ট এজিআট্রুপ মিশ্রণ এটাৰ উদাহৰণ দিয়া।

উচ্চতম স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট অ্যাজিওট্রুপ মিশ্রণেৰ একটি উদাহৰণ দাও।

- (b) A solution of Urea ( $\text{NH}_2\text{CONH}_2$ ) boils at  $100.18^\circ\text{C}$  at the atmospheric pressure. If  $K_f$  and  $K_b$  for water are 1.86 and 0.512  $\text{Kkgmol}^{-1}$  respectively, calculate the freezing point of the solution.

2

ইউরিয়ার ( $\text{NH}_2\text{CONH}_2$ ) দ্রবণ এটাৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপত 100.18°C ত উত্লিবলৈ ধৰে। যদি পানীৰ  $K_f$  আৰু  $K_b$  ৰ মান ক্ৰমে 1.86 আৰু 0.512  $\text{Kkgmol}^{-1}$  হয়, দ্রবণটোৱ হিমাংক গণনা কৰা।

ইউরিয়ার ( $\text{NH}_2\text{CONH}_2$ ) একটি দ্রবণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 100.18°C -তে উত্লাতে শুৰু কৰে। যদি জলেৱ  $K_f$  এবং  $K_b$  -এৰ মান ক্ৰমে 1.86 এবং 0.512  $\text{Kkgmol}^{-1}$  হয়, দ্রবণটিৱ হিমাংক গণনা কৰো।

20. (a) What is the value of Van't Hoff factor ( $i$ ) for a dilute solution of the strong electrolyte barium hydroxide ?

1

তীৰ্ত বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য বেৰিয়াম হাইড্ৰোক্ষাইডৰ এটা লঘু দ্রবণৰ বাবে ভেণ্ট হফ গুণক ( $i$ ) ৰ মান কিমান ?

তীৰ্ত বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য বেৰিয়াম হাইড্ৰোক্ষাইডেৰ একটি লঘু দ্রবণেৰ জন্য ভ্যান্ট হফ গুণক ( $i$ ) - এৰ মান কত ?

- (b) At  $100^\circ\text{C}$  the vapour pressure of a solution of 6.5g of a solute in 100g water is 732mm. If  $K_b=0.52$ , calculate the boiling point of the solution.

2

$100^\circ\text{C}$  তাপমাত্ৰাত 100 গ্ৰাম পানীত এটা দ্রাবণৰ 6.5g দ্রবীভূত হৈ থাকিলে বাষ্পচাপ 732mm হয়। যদি  $K_b=0.52$  হয়, তেন্তে দ্রবণটোৱ উত্লাংক গণনা কৰা।

$100^\circ\text{C}$  তাপমাত্ৰায় 100 গ্ৰাম জলে একটি দ্রাবণেৰ 6.5g দ্রবীভূত হয়ে থাকিলে বাষ্প চাপ 732mm হয়। যদি  $K_b=0.52$  হয়, তাহলে দ্রবণটিৱ স্ফুটনাঙ্ক গণনা কৰো।

**Or / নাইবা / অথবা**

Show that total vapour pressure over the solution of two liquids 1 and 2 at a particular temperature varies linearly with the mole fraction of a component.

2

দেখুওৰা যে এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত দুটা তৰল 1 আৰু 2 ৰ দ্রবণ এটাৰ ওপৰৰ মুঠ বাষ্পীয় চাপ দ্রবণটোৱ এটা উপাংশৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ লগত সৱলৈখিকভাৱে পৰিৱৰ্ত্ত হয়।

দেখুও যে একটি নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতায় দুটি তৰল 1 এবং 2-এৰ একটি দ্রবণেৰ উপৱে মোট বাষ্পীয় চাপ দ্রবণটিৱ একটি উপাংশেৰ মোল ভগ্নাংশেৰ সঙ্গে সৱলৈখিকভাৱে পৰিৱৰ্ত্তিত হয়।

21. For a cell reaction involving a two-electron change, the standard e.m.f. of the cell is found to be 0.295 V at 25°C. Calculate the equilibrium constant of the reaction at 25°C. 3

দুটা-ইলেক্ট্রন পরিবর্তনৰ সৈতে জড়িত কোষ বিক্রিয়া এটাৰ 25°C তাপমাত্ৰাত কোষটোৱ e.m.f. ৰ মান 0.295 V পোৱা যায়। 25°C ত বিক্রিয়াটোৱ সাম্য ধৰকৰ মান গণনা কৰা।

দুটি ইলেক্ট্রন পরিবর্তনৰ সঙ্গে জড়িত একটি কোষ বিক্রিয়াৰ 25°C তাপমাত্ৰায় কোষটিৰ e.m.f. -এৰ মান 0.295 V পাওয়া যায়। 25°C -তে বিক্রিয়াটিৰ সাম্য ধৰকেৰ মান গণনা কৰো।

22. The half-life period of a first-order chemical reaction is 6.93 minutes. Calculate the time required for the completion of 99% of the chemical reaction. 3

এটা প্রথম ক্রমৰ রাসায়নিক বিক্রিয়াৰ অধি-জীৱনকাল 6.93 মিনিট। রাসায়নিক বিক্রিয়াটোৱ 99% সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সময় গণনা কৰা।

একটি প্রথম ক্রমৰ রাসায়নিক বিক্রিয়াৰ অধি-জীৱনকাল 6.93 মিনিট। রাসায়নিক বিক্রিয়াটিৰ 99% সম্পূৰ্ণ হতে প্ৰয়োজন হওয়া সময় গণনা কৰো।

*Or / নাহিবা / অথবা*

The half-life period of a certain reaction  $A \rightarrow \text{Products}$  is 1 hour, when the initial concentration of the reactant 'A' is  $2.0 \text{ mol L}^{-1}$ . How much time does it take to reduce the concentration from  $0.50 \text{ mol L}^{-1}$  to  $0.25 \text{ mol L}^{-1}$  if it is a zero-order reaction ? 3

এটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া  $A \rightarrow$  বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থৰ অধি-জীৱন কাল 1 ঘণ্টা, যেতিয়া বিক্রিয়কৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তা  $2.0 \text{ mol L}^{-1}$  হয়। ইয়াৰ গাঢ়তা  $0.50 \text{ mol L}^{-1}$  ৰ পৰা  $0.25 \text{ mol L}^{-1}$  হ'বলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে বিক্রিয়াটো শূন্য ক্ৰমৰ হয়?

একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া  $A \rightarrow$  বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থৰ অধি-জীৱনকাল হল 1 ঘণ্টা, যখন বিক্রিয়কেৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তা  $2.0 \text{ mol L}^{-1}$  হয়, এৰ গাঢ়তা  $0.50 \text{ mol L}^{-1}$  থেকে  $0.25 \text{ mol L}^{-1}$  হতে কত সময়েৰ প্ৰয়োজন হবে যদি বিক্রিয়াটি শূন্য ক্ৰমেৰ হয়?

23. For the reaction,  $2A + B \rightarrow$  products, when the concentrations of A and B both were doubled the rate of the reaction increased from  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  to  $2.4 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ . When the concentration of A alone is doubled, the rate increased from  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  to  $0.6 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ . What is the order of the reaction with respect to B ? 3

$2A + B \rightarrow$  products বিক্রিয়াটোর বাবে যেতিয়া A আৰু B দুয়োৰে গাঢ়তা দুণ্ডণ হয় তেতিয়া বিক্রিয়াটোৰ হাৰ  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  ৰ পৰা  $2.4 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  লৈ বৃদ্ধি পায়। যেতিয়া কেৱল A ৰ গাঢ়তা দুণ্ডণ কৰা হয়, বিক্রিয়াটোৰ হাৰ  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  ৰ পৰা  $0.6 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  লৈ বৃদ্ধি পায়। B ৰ সাপেক্ষে বিক্রিয়াটোৰ ক্ৰম কিমান হ'ব?

$2A + B \rightarrow$  products বিক্রিয়াটিৰ জন্য যখন A এবং B দুটিৱই গাঢ়ত্ব দিণ্ডণ হয় তখন বিক্রিয়াটিৰ হাৰ  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ -এৰ থেকে  $2.4 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ -এ বৃদ্ধি পায়। যখন কেবল A-এৰ গাঢ়ত্ব দিণ্ডণ কৰা হয়, বিক্রিয়াটিৰ হাৰ  $0.3 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ -এৰ থেকে  $0.6 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ -এ বৃদ্ধি পায়। B-এৰ সাপেক্ষে বিক্রিয়াটিৰ ক্ৰম কত হবে?

24. How do you convert the following : (*any two*)

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$

তলত দিয়াৰোৰ কেনেকৈ পৰিবৰ্তন কৰিবা : (যিকোনো দুটা)

নিম্নোক্ত প্ৰশ্নগুলি কীভাৱে পৰিবৰ্তন কৰিবে : (যে-কোনো দুটি)

(i) 1-bromopropane to 2-bromopropane

1-ব্ৰ'ম'প্ৰপেনৰ পৰা 2-ব্ৰ'ম'প্ৰপেন

1-ব্ৰোমোপ্ৰপ্যানেৰ থেকে 2-ব্ৰোমোপ্ৰপ্যান

(ii) Benzene to Diphenyl

বেনজিনৰ পৰা ডাইফিনাইল

বেনজিন থেকে ডাইফিনাইল

(iii) Aniline to Chlorobenzene

এনিলিনৰ পৰা ক্ল'ৰ'বেনজিন

অ্যানিলিন থেকে ক্লোৱেনজিন

25. Explain why : (any two)

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$

কারণ দর্শোৱা : (যিকোনো দুটি)

কারণ ব্যাখ্যা করো : (যে-কোনো দুটি)

- (i) Haloarenes undergo electrophilic substitution reactions while haloalkanes undergo only nucleophilic substitution reaction.

হেল'এরিনে ইলেক্ট্রফিলীয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত করে, আনহাতে হেল'এলকেনে নিউক্লিয়ফিলীয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত করে।

হ্যালোঅ্যারিন ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত করে, অন্যদিকে হ্যালোঅ্যালকেন নিউক্লিয়োফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত করে।

- (ii) During synthesis of Grignard reagent, it is necessary to maintain anhydrous condition.

গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুত করোতে অনার্দ্র পরিবেশের দরকার।

গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুত করতে অনার্দ্র পরিবেশের দরকার।

- (iii) Although haloalkanes are polar in nature, they are immiscible in water.

হেল'এলকেন বিলাক ধ্রুবীয় হলেও সেইবোৰ পানীত অদ্বিতীয়।

হ্যালোঅ্যালকেনগুলি ধ্রুবীয় হলেও সেগুলি জলে অদ্বিতীয়।

26. (a) What will happen when vapours of  $3^{\circ}$  alcohol is passed over heated copper at 573K ?

1

573K উষ্ণতাত উত্তপ্ত কপারৰ ওপৰেদি  $3^{\circ}$  এলক'হলৰ বাষ্প চালিত কৰিলে কি হ'ব?

573K উষ্ণতায় উত্তপ্ত তামার উপৰ দিয়ে  $3^{\circ}$  অ্যালকোহলেৰ বাষ্পচালনা কৰলে কী হবে?

- (b) How will you synthesis Phenol from Cumene? Give only chemical reaction.

2

কিউমিনৰ পৰা ফেনল কেনেকৈ প্রস্তুত কৰিব পাৰি? কেবল ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।




কিউমিন থেকে ফেনল কীভাৱে প্রস্তুত কৰা যেতে পাৰে? কেবল ৰাসায়নিক সমীকৰণ লেখো।

27. (a) Identify A, B and C :

1+1+1=3

A, B, C ক চিনাত্ত কৰা :

A, B, C -কে শনাত্ত কৰো :



Or / নাইবা / অথবা

(b) Write only the chemical reactions for the following :

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$

নিম্নলিখিতসমূহৰ বাবে কেবলমাত্ৰ রাসায়নিক সমীকৰণ লিখা :

নিম্নোক্তগুলিৰ জন্য কেবলমাত্ৰ রাসায়নিক সমীকৰণ লেখো :

(i) Etard reaction

এটাৰ্ড বিক্ৰিয়া

এটাৰ্ড বিক্ৰিয়া

(ii) Gattermann-Koch reaction

গাটাৰমেন-কোচ বিক্ৰিয়া

গাটাৰম্যান-কোচ বিক্ৰিয়া

28. (a) Match Table-I with Table-II —

2

Table-I के Table-II र सৈতে মিলোৱা —

স্তুপ্ত-1 কে স্তুপ্ত-2-এর সাথে মেলাও —


|   | Table-I<br>(Conversion)<br>(পরিবর্জন / পরিবর্তন)  |     | Table-II<br>(Number of Faraday required/<br>প্রয়োজনীয় ফেরাডের সংখ্যা / প্রয়োজনীয় ফেরাডের সংখ্যা) |
|---|---|-----|--|
| A | 1 mole of H <sub>2</sub> O to O <sub>2</sub><br>1 ম'ল H <sub>2</sub> O ব পৰা O <sub>2</sub> লৈ<br>1 মোল H <sub>2</sub> O -এর থকে O <sub>2</sub> -তে   | I   | 3F   |
| B | 1 mol of MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup> to Mn <sup>2+</sup><br>1 ম'ল MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup> ব পৰা Mn <sup>2+</sup> লৈ<br>1 মোল MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup> -এর থকে Mn <sup>2+</sup> -তে | II  | 2F   |
| C | 1.5 mol of Ca from molten CaCl <sub>2</sub><br>1.5 ম'ল CaCl <sub>2</sub> ব পৰা Ca লৈ<br>1.5 মোল CaCl <sub>2</sub> -এর থকে Ca -তে  | III | 1F   |
| D | 1 mol of FeO to Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>1 ম'ল FeO ব পৰা Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> লৈ<br>1 মোল FeO -এর থকে Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -তে                                     | IV  | 5F   |

(b) Calculate the standard cell potential (in V) of the cell in which the following reaction takes place.

3

নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটোৱ বাবে প্ৰমাণ ইলেক্ট্ৰোড বিভৱৰ মান (V ত) গণনা কৰা।

নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটিৱ জন্য প্ৰমাণ ইলেক্ট্ৰোড বিভবেৰ মান (V -তে) গণনা কৰো।



Given that (দিয়া আছে/ দেওয়া আছে)

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = x \text{ V}; E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = y \text{ V}; E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}} = z \text{ V}$$

29. (a) What will happen when (any two) -

1+1=2

কি ঘটে, যেটো (যিকোনো দুটা) -

কি ঘটে, যখন (যে-কোনো দুটি) -

(i) Cyclohexanol is treated with  $\text{CrO}_3$ .

চাইক্লোহেক্সানলক  $\text{CrO}_3$  ব সৈতে বিক্রিয়া করালে।

সাইক্লোহেক্সানলকে  $\text{CrO}_3$ -এর সঙ্গে বিক্রিয়া করালে।

(ii) Cyclohexanecarbaldehyde treated with Zinc amalgam and dilute hydrochloric acid.

চাইক্লোহেক্সেন কার্বেলডিহাইডক যিংক এমালগাম আৰু লঘু হাইড্ৰোক্লুবিক এচিডৰ সৈতে বিক্রিয়া করালে।

সাইক্লোহেক্সেন কার্বেলডিহাইডকে জিংক অ্যামালগাম এবং লঘু হাইড্ৰোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করালে।

(iii) Acetic acid treated with Chlorine in the presence of red Phosphorus and followed by hydrolysis.

এচিটিক এচিডক ক্লুবিণৰ সৈতে বঙ্গ ফচফৰাছৰ উপস্থিতিত বিক্রিয়া কৰি জলীয় অপাঘটন কৰালে।

এসিটিক অ্যাসিডকে ক্লোরিনের সঙ্গে লাল ফসফৰাসের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া কৰিয়ে জলীয় অপাঘটন কৰালে।

(b) An organic compound  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$  cannot be reduced by Tollens' reagent, but reacts with Brady's reagent to give orange precipitate. On vigorous oxidation give ethanoic acid and propanoic acid. The compound also gives iodoform test. Identify the compound and write the chemical reactions involved. 3

$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$  আণবিক সংকেত বিশিষ্ট এটা জৈবযৌগক ট'লেনৰ বিকাৰকৰ দ্বাৰা বিজাৰণ ঘটাৰ নোৱাৰি, কিন্তু ব্ৰেডিৰ বিকাৰকৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি কমলা বঙ্গৰ অধঃক্ষেপ উৎপন্ন কৰে। তীব্ৰ জাৰণ বিক্রিয়াৰ ফলত যৌগটোৱ পৰা ইথায়নিক এছিদ আৰু প্ৰোপানয়িক এছিদ উৎপন্ন হয়। যৌগটোৱে আয়'ড'ফৰ্ম বিক্রিয়াও দেখুৱায়। যৌগটো চিনান্ত কৰা আৰু বিক্রিয়াকেইটা লিখা।

$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$  আণবিক সংকেতবিশিষ্ট একটি জৈব যৌগকে টোলেনেৰ বিকাৰকেৰ দ্বাৰা বিজাৰণ ঘটানো ঘায় না, কিন্তু ব্ৰাডিৰ বিকাৰকেৰ সঙ্গে বিক্রিয়া কৰে কমলা রঞ্জেৰ অধঃক্ষেপ উৎপন্ন কৰে। তীব্ৰ জাৰণ বিক্রিয়াৰ ফলে যৌগটি থেকে ইথানেয়িক অ্যাসিড এবং প্ৰোপানয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। যৌগটি আয়োডোফৰ্ম বিক্রিয়াও দেখায়। যৌগটি শনান্ত কৰো এবং বিক্রিয়াগুলি লেখো।

30. (a) How do you explain the amphoteric behavior of amino acids ?

2

এমিন' এচিডৰ উভয়ধর্মী আচরণ কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিবা ?

অ্যামিনো অ্যাসিডের উভয়ধর্মী আচরণ কীভাবে ব্যাখ্যা কৰবে ?

Or / নাইবা / অথবা

Why polysaccharides are called non-reducing sugars ?

2

পলিচেকারাইডবোৰক কিয় অনা-শৰ্কৰা বোলা হয় ?

পলিস্যাকারাইডগুলিকে কেন অনা-শৰ্কৰা বলা হয় ?

(b) What is peptide bond ? Give one example of essential amino acid.

1+1=2

পেপ্টাইড বান্ধনি কি ? এটা অপৰিহার্য এমিন' এচিডৰ উদাহৰণ দিয়া।

পেপ্টাইড বান্ধনী কী ? একটি অপৰিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের উদাহৰণ দাও।

Or / নাইবা / অথবা

State the difference between Nucleosides and Nucleotides ?

1+1=2

নিউক্লিআ টাইড আৰু নিউক্লিআ ছাইডৰ মাজৰ পার্থক্য লিখা।

নিউক্লিওটাইড এবং নিউক্লিওসাইডের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

(c) How do you explain the absence of aldehyde group in the pentaacetate of D-glucose ?

1

D-গ্লুক'জৰ পেন্টাএচিটেট এলডিহাইড গোটৰ অনুপস্থিতি কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিবা ?

D-গ্লুকোজ-এৰ পেন্টাঅ্যাসিটেটে অ্যালডিহাইড শ্ৰেণীৰ অনুপস্থিতি কীভাবে ব্যাখ্যা কৰবে ?

Or / নাইবা / অথবা

Write the name of two monosaccharides obtained by hydrolysis of lactose sugar.

1

লেক্ট'জৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে উৎপন্ন হোৱা মন'ছেকেৰাইড গোট দুটাৰ নাম লিখা।

ল্যাক্টোজেৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে উৎপন্ন হওয়া মোনোস্যাকেৱাইড শ্ৰেণী দুটিৰ নাম লেখো।

— X —